

Broedvogels in het Munsterbos in 2007

In 2006 werden voor het eerst alle soorten opgetekend volgens de integrale territoriumkartering. De algemene en zeer algemene soorten werden geturfd en de zeldzame en/of indicatorsoorten werden nauwkeurig op kaart aangeduid. Dezelfde methode werd eveneens het voorbije jaar gehanteerd maar de algemene en zeer algemene soorten werden niet geturfd.

In grote lijnen zijn de resultaten van het monitoringonderzoek dezelfde in beide jaren. Wel waren er toch een aantal belangrijke veranderingen.

Door kappen van de struiken en bomen op de dijken en in de vijvers, heeft het vijvergebied grotendeels zijn open karakter terug gekregen. Er was één territorium van Blauwborst meer dan in 2006 en de aantallen van de Kleine Karekiet groeiden aan tot 35 territoria. De Waterral nam toe van 4 territoria tot maar liefst 16 territoria. Eveneens vestigden zich twee paren Grauwe Gans maar voorlopig waren er nog geen jongen. Het aantal territoria van de Rietgors daalde naar twee. De overige watervogels bleven constant.

Van de bosvogels werden een aantal indicatoren gericht onderzocht. De dagroofvogels bleven met Wespindief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenavalk en Boomvalk constant. Maar zowel Bosuil als Ransuil verminderden met één broedpaar. Mogelijk is predatie van de Havik hier aan de orde. De Spechten bleven eveneens in grote orde hetzelfde. Gericht onderzoek naar de Grote Bonte leverde meer territoria op in vergelijking met vorig jaar.

Belangrijk is wel dat de Middelste Bonte Specht met twee broedparen aanwezig was na de vestiging in 2006. In de rest van Haspengouw verdween deze soort uit verschillende locaties na de plotse vestiging in 2006.

Volgende soorten verdwenen uit het Munsterbos: Bonte Vliegenvanger, Fluiters, Kruisbek, Putter en Sprinkhaanzanger. Naar de Bonte Vliegenvanger werd het voorbije jaar minder intensief uitgekeken. In de nabij toekomst zullen we hier nestkasten voor ophangen om zijn vestiging definitief te verzekeren.

Voor de Kruisbek was het een slecht jaar (geen voedsel) en dan verhuizen deze zigeuners massaal. Wanneer er weer voldoende kegels van Fijnsparren en andere naaldhoutsoorten aanwezig zijn, zal deze ook in het Munsterbos weer opdagen. Deze soort zal samen met Putter en Sijs in schommelende aantallen vertegenwoordigd zijn.

In het heidegebied waren de kenmerkende soorten aanwezig met: Boomleeuwerik, Boompieper en Roodborsttapuit. Zelfs een Nachtzwaluw vertoefde enkele dagen in het voorjaar in dit heidebiotoop. We verwachten deze belangrijke broedvogel alleszins binnen enkele jaren.

Na inrichting van het vijvergebied met sluizen en toevoersloten, zullen zeker de moerasvogels nog aan belang gaan winnen in de nabije toekomst. We verwachten zeker Roerdomp en Woudaapje die er vijftig jaar geleden jaarlijks broedvogel waren.

Door de reeds uitgevoerde werkzaamheden is het Munsterbos, zoals de overzichtslijst aanduidt, een zeer belangrijk vogelgebied geworden in de provincie en Vlaanderen.

Verslaggever Jan Gabriëls, Echellaan 12, 3740 Bilzen